

#### **A4. ANALIZA VARIABILITATII SPATIALE PENTRU VARIABLE ALFANUMERICE**

**OBIECTIV:** *identificarea LEGII DE VARIATIE SPATIALA (L.V.S.)* pentru fiecare valoare distincta a variabilei alfanumerice (**Geomorfologie**)

- o L.V.S. pentru “LUNCA”
- o L.V.S. pentru “TERASA”
- o L.V.S. pentru “ZONA COLINARA”

#### **DATE NECESARE:**

- *coordonatele spatiale* ale punctelor de observatie pentru geomorfologie
- *valorile variabilei* alfanumerice:
  - “LUNCA”
  - “TERASA”
  - “ZONA COLINARA”

Pregatirea fisierului cu date:


- crearea unei foi noi de lucru in fisierul “**Date\_prelucrate.xls**” – “*AVS\_Geomorfologie*”
- copierea datelor necesare (coordonatele pct. de obs. si valorile variabilei alfanumerice) in foaia “*AVS\_Geomorfologie*”

#### **METODOLOGIA A.V.S. pentru variabile alfanumerice (valoarea “LUNCA”):**

- **codificarea binara** a valorii “LUNCA” a variabilei alfanumerice
  - **1 (unu)** – semnifica prezenta valorii “LUNCA” in punctul de observatie
  - **0 (zero)** – semnifica absenta valorii “LUNCA” din punctul de observatie
- **calculul si reprezentarea grafica a variogramei indicatoare experimentale** (in Surfer):
  - deschiderea unui fisier de tip PLOT;
  - *Grid – Variogram – New variogram*
  - programul calculeaza variograma indicatoare experimentala presupunand ca structura este izotropa (Tolerance = 90°) – aceasta este variograma indicatoare experimentala **OMNIDIRECTIONALA**
  - salvarea variogramei indicatoare experimentale omnidirectionale “**Vario\_omni\_Lunca.srf**” in directorul “*Prelucrari\_rezultate*”

Daca pe variograma indicatoare omnidirectionala punctele se asaza intr-o **tendinta** in sensul cresterii valorilor, inseamna ca **EXISTA o structura spatiala**. Daca valorile sunt distribuite **aleator**, **NU EXISTA o structura spatiala** si prelucrarile se opresc la rezultatele obtinute in etapa de analiza a variabilitatii globale (A.V.G.).

Intrucat valorile variogramei indicatoare experimentale omnidirectionale se distribuie intr-o tendinta crescatoare (la cresterea distantei de calcul) pentru valoarea "lunca", putem spune ca **EXISTA o lege de variatie spatiala** pentru aceasta valoare.




- **analiza anizotropiei structurii spatiale**

- *alegerea tolerantei de directie* -  $\Delta\theta < 90^\circ$ ;  $\Delta\theta = 30^\circ$
- calculul variogramelor indicatoare experimentale pe minim 4 directii (**variograme directionale**) si compararea lor:
  - directia N-S ( $\theta = 90^\circ$ );
  - directia V-E ( $\theta = 0^\circ$ );
  - directia NE-SV ( $\theta = 45^\circ$ );
  - directia NV-SE ( $\theta = 135^\circ$ ).
- *stabilirea tipului de structura*. Comparand variogramele indicatoare directionale, observam ca **structura este ANIZOTROPA** (modul de variatie a valorilor variogramei difera in functie de directia de calcul). Nu vom calcula parametrii de anizotropie si vom considera ca structura este izotropa.

- **modelarea variogramei indicatoare experimentale omnidirectionale**

- *deschiderea variogramei* indicatoare experimentale omnidirectionale pentru "LUNCA";
- *stergerea modelului* pe care il propune programul (model liniar);
- *alegerea tipului de model* pentru variograma indicatoare experimentală omnidirectionala;
  - **model liniar**;

- *calibrarea modelului* astfel incat diferentele dintre valorile variogramei indicatoare experimentale omnidirectionale si valorile variogramei calculate cu modelul ales sa fie minime:
  - ***panta modelului = 0.000088;***
- *salvarea fisierului* cu modelul variogramei indicatoare experimentale omnidirectionale ***“Model\_variograma\_LUNCA.srf”*** in directorul ***“Prelucrari\_rezultate”***.



**CONCLUZIA A.V.S. pentru variabile alfanumerice (Geomorfologie – valoarea “LUNCA”):** modelul LINIAR cu panta 0.000088 este LEGEA DE VARIATIE SPATIALA a valorii “LUNCA” in domeniul investigat.

**CONCLUZIA A.V.S. pentru variabile alfanumerice (Geomorfologie – valoarea “TERASA”):** modelul LINIAR cu panta 0,000056 este LEGEA DE VARIATIE SPATIALA a valorii “TERASA” in domeniul investigat.

**CONCLUZIA A.V.S. pentru variabile alfanumerice (Geomorfologie – valoarea “ZONA COLINARA”):** modelul LINIAR cu panta 0,000034 este LEGEA DE VARIATIE SPATIALA a valorii “ZONA COLINARA” in domeniul investigat.